



BARRARE CON UNA "X" LA RISPOSTA CHE SI RITIENE CORRETTA

1. Con l'acronimo FASAS si intende:  
 A) Fascicolo Socio Assistenziale e Sanitario  
 B) Fascicolo Sociale Assistenziale Singolo  
 C) Fascicolo Socio Assistenziale e Sicurezza
2. L'ileo paralitico è caratterizzato da:  
 A) Distensione addominale, malessere, rumori intestinali assenti  
 B) Distensione addominale, malessere, rumori intestinali presenti  
 C) Nessuna delle precedenti alternative è corretta
3. L'atassia è:  
 A) La differenza del diametro delle due pupille  
 B) La perdita della capacità di parlare  
 C) Incoordinazione nell'esecuzione dei movimenti
4. La distonia è:  
 A) La mancanza di sintonia con gli altri  
 B) Un disturbo della tonicità dei muscoli  
 C) L'incapacità a discriminare i toni acuti e gravi
5. Il TIA è:  
 A) Un deficit neurologico focale reversibile di origine vascolare  
 B) Un deficit neurologico focale irreversibile  
 C) Una improvvisa perdita di coscienza
6. Quali sono gli elementi che compongono le proteine?  
 A) Carbonio idrogeno ossigeno azoto  
 B) Idrogeno ossigeno e azoto  
 C) Carbonio e azoto
7. Per un corretto posizionamento del sondino naso-gastrico, bisogna predisporre tra il materiale occorrente:  
 A) Il fonendoscopio  
 B) Il pallone di Ambu  
 C) Una pinza di Klemmer
8. Quali delle seguenti patologie NON si esprimono clinicamente con dolore addominale?  
 A) Pancreatite  
 B) Infarto miocardico inferiore  
 C) Pericardite
9. Che cos'è il Piano Sanitario Nazionale?  
 A) Il documento programmatico mediante il quale sono stabilite le linee di indirizzo dell'ATS  
 B) Il documento programmatico mediante il quale sono stabilite le linee generali di indirizzo del Servizio Sanitario Nazionale  
 C) Il documento programmatico adottato dall'OMS di concerto con il Ministro della Salute per la tutela della salute di chi viaggia
10. Se durante una trasfusione di globuli rossi il paziente manifesta brividi, cefalea, dolori, sensazione di calore, è necessario immediatamente:  
 A) Diminuire la velocità di infusione e chiamare il medico  
 B) Sospendere la trasfusione, tenere la vena aperta con soluzione fisiologica e chiamare il medico  
 C) Controllare i parametri vitali e chiamare il medico



11. Le ulcere da pressione allo stadio 3 e 4 sono più facilmente infettate da:
- A) Aerobi gram negativi
  - B) Cocchi gram positivi
  - C) Anaerobi
12. Possono essere apposte sulla confezione dei medicinali annotazioni riguardo la data di scadenza?
- A) Sì per evidenziare meglio la data di scadenza
  - B) Sì, ma solo per i medicinali conservati in frigorifero
  - C) No, per evitare errori nella fase di trascrizione
13. Per trombosi si intende:
- A) Formazione di coaguli nel cuore o nei vasi sanguigni
  - B) Rottura dei vasi sanguigni
  - C) Emorragie ripetute
14. Qual è il significato del termine "leucocitosi"?
- A) Eccesso di globuli bianchi
  - B) Carenza di piastrine
  - C) Carenza di globuli bianchi
15. Un paziente che assume warfarin per f.a. cronica, il giorno antecedente l'intervento chirurgico, è probabile che:
- A) Riceva solo eparina a basso peso molecolare s.c.
  - B) Assuma walfarin come sempre
  - C) Assuma walfarin a metà dosaggio associato ad eparina s.c.
16. Prima di applicare la contenzione fisica su pazienti, l'infermiere deve riportare nel diario infermieristico che:
- A) C'è la prescrizione del medico per attuare la contenzione
  - B) L'intervento è clinicamente giustificato e sono state considerate le condizioni generali del paziente
  - C) Tutte le precedenti risposte sono esatte
17. La riacutizzazione della BPCO è caratterizzata:
- A) Da ipossiemia tale da mettere a rischio la vita del paziente
  - B) Dalla comparsa di dispnea, oppressione toracica, anemia e febbre
  - C) Dalla comparsa e peggioramento della dispnea con tosse ed aumento dell'escreato
18. Prima di procedere con la broncoaspirazione il paziente va ossigenato:
- A) Per pochi secondi
  - B) Per almeno tre minuti
  - C) Per almeno un minuto
19. Quale manifestazione è possibile rilevare nell'accertamento di un paziente con scompenso prevalente destro?
- A) Escreato rosso schiumoso
  - B) Versamento pleurico destro
  - C) Distensione delle vene giugulari
20. In caso di crisi epilettica, quale tra i seguenti è il primo intervento da effettuare?
- A) Mettere il paziente in sicurezza per evitare che possa farsi male durante la crisi
  - B) Reperire un accesso venoso
  - C) Rilevare i parametri



21. Qual è l'autorità di controllo in Italia che vigila sul rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali?
- A) Nucleo specializzato provinciale dei Carabinieri (NAS)
  - B) Autorità nazionale controllo, protezione, sicurezza dei dati
  - C) Il Garante per la protezione dei dati personali
22. È indice di malnutrizione severa:
- A) Una perdita di peso superiore al 20% in sei mesi
  - B) Una perdita di peso del 10% in un anno
  - C) Una perdita di peso del 10% in sei mesi
23. In caso di delirium nell'anziano, quali farmaci possono avere un effetto paradossale peggiorando l'agitazione?
- A) Le benzodiazepine
  - B) L'aloiperidolo
  - C) Gli antipsicotici atipici
24. In caso di sovradosaggio da Aloperidolo, quali sintomi possono manifestarsi?
- A) Nausea e/o vomito
  - B) Rigidità extrapiramidale
  - C) Diplopia
25. Che cosa s'intende per wandering?
- A) Deambulazione afinalistica
  - B) Deambulazione associata a bradicinesia
  - C) Deambulazione instabile
26. Quali fra queste è una causa predisponente alla infezione da Clostridium Difficile nell'anziano?
- A) Terapia antibiotica ad ampio spettro prolungata
  - B) Disidratazione
  - C) Diabete Mellito tipo 2
27. In una persona anziana con grave deterioramento cognitivo quale delle seguenti scale è indicata per valutare la presenza del dolore?
- A) NRS
  - B) VRS
  - C) PAINAD
28. L'alimentazione dell'anziano con sarcopenia deve prevedere principalmente:
- A) Aumento della percentuale calorica
  - B) Aumento della percentuale di proteine
  - C) Aumento della percentuale di fibre
29. Il PAI (piano/progetto personalizzato) deve assolutamente contenere:
- A) La storia dell'utente, le sue richieste e la valutazione del suo stato di salute
  - B) Problemi/abilità, obiettivi condivisi, indicatori di valutazione, tempi di valutazione
  - C) Problemi/abilità, obiettivi condivisi, la storia e i tempi di valutazione
30. Quale di questi è un indirizzo corretto di un sito internet:
- A) mario.rossi@tin.it
  - B) www.mario-rossi.it
  - C) www.mariorossi@www



BARRARE CON UNA "X" LA RISPOSTA CHE SI RITIENE CORRETTA

1. Le consegne (informazioni che si passano di turno in turno) date agli operatori di assistenza:  
 A) Devono comprendere tutto quanto accaduto nel turno precedente  
 B) Comprendono solo gli eventi salienti del turno precedente, le altre informazioni si trovano nella cartella assistenziale integrata  
 C) Comprendono le informazioni necessarie allo svolgimento del proprio turno e dei turni successivi nel rispetto delle continuità assistenziale
2. Le verifiche PAI secondo la normativa 514/2009 e s.m.i. deve essere fatta:  
 A) Ogni qual volta gli infermieri e gli educatori valutano l'ospite  
 B) Trimestralmente  
 C) Ad ogni modifica delle condizioni generali dell'ospite e/o semestralmente
3. La definizione di malattia terminale comprende i termini di:  
 A) Profonda sofferenza, angoscia, paura di morire e inguaribilità  
 B) Inguaribilità, evolutività verso il decesso, aspettativa di vita non lunga o breve  
 C) Evolutività verso il decesso, inguaribilità e tempi di evoluzione molto lunghi
4. I quattro principi della Bioetica sono:  
 A) Beneficienza, non maleficenza, equità, autonomia  
 B) Giustizia, intangibilità, fermezza, sicurezza  
 C) Equità, autonomia, efficienza, beneficienza
5. I germi responsabili di ulcere da pressione infette sono:  
 A) Cocchi gram positivi  
 B) Aerobi gram negativi  
 C) Entrambi i precedenti
6. I requisiti sostanziali e formali della documentazione sanitaria devono essere:  
 A) Veridicità, chiarezza, completezza, contestualità e rintracciabilità, indicazione di data e ora, precisazione nome e cognome, firma, intellegibilità della grafia  
 B) Veridicità, completezza, contestualità e rintracciabilità, indicazione di data e ora, precisazione nome e cognome, firma  
 C) Veridicità, chiarezza, completezza, contestualità e rintracciabilità, indicazione di data e ora, precisazione nome e cognome, firma, intellegibilità della grafia, annotazioni postume
7. Quando cominciare l'alimentazione dopo il confezionamento di una PEG primo impianto?  
 A) Dopo 24 ore, velocità 40 cc/h  
 B) Dopo 12 ore, velocità 40 cc/h  
 C) Dopo 8 ore, velocità 40 cc/h
8. Quali sono le sorgenti di infezione della Legionella nosocomiale?  
 A) Impianti idrici  
 B) Dispositivi per respirazione assistita  
 C) Entrambe le precedenti
9. Nell'occlusione intestinale l'alvo è:  
 A) chiuso a gas e feci  
 B) aperto a gas e feci  
 C) aperto ai gas
10. Possono esse apposte sulla confezione dei medicinali annotazioni riguardo la data di scadenza?  
 A) Sì, per evidenziare meglio la data di scadenza  
 B) No, per evitare errori nella fase di trascrizione  
 C) Sì, ma solo per i medicinali conservati in frigorifero



11. Prima della somministrazione di alimentazione tramite sondino naso gastrico:
- A) Si deve verificare la presenza di ristagno gastrico
  - B) Si devono iniettare almeno 50 ml di acqua
  - C) Si modifica leggermente la posizione del sondino per essere certi che non aderisca alla parete gastrica
12. La fragilità include dimensioni di tipo:
- A) Fisico biologico
  - B) Fisico biologico sociale
  - C) Fisico biologico psicologico sociale
13. In quali casi l'intervento di contenzione deve essere documentato all'interno della cartella sanitaria?
- A) Dipende dal tipo di contenzione
  - B) Sempre
  - C) In base a valutazione medica sul paziente
14. Quali dei seguenti rifiuti sono classificati come rifiuti speciali potenzialmente infetti?
- A) Farmaci scaduti
  - B) Pile esaurite
  - C) Tine test
15. Il dolore deve essere valutato e documentato:
- A) Ad intervalli regolari
  - B) Dopo un appropriato intervallo di tempo da un intervento farmacologico
  - C) Entrambe le precedenti
16. Per valutare lo spettro più ampio possibile di anomalie comportamentali nella persona affetta da demenza, quale tra le seguenti scale posso impiegare?
- A) BDI
  - B) CDR
  - C) UCLA NPI
17. Tutte le seguenti situazioni possono essere indotte dalla ventilazione meccanica, TRANNE:
- A) Pneumotorace iperteso
  - B) Coma
  - C) Diminuzione della portata cardiaca
18. Durante un periodo dell'anno non molto caldo, per paziente in scompenso cardiaco con segni di ritenzione di liquidi, l'assunzione di acqua deve essere ristretta a:
- A) < 1,5 L / giorno
  - B) < 2,5 L / giorno
  - C) < 3 L / giorno
19. Quando si ferma la respirazione, il danno cerebrale avviene entro:
- A) 2 minuti
  - B) 8 minuti
  - C) 5 minuti
20. Quale posizione deve assumere il paziente per consentire la raccolta di succo gastrico dal sondino?
- A) Sdraiato sul lato sinistro
  - B) Sdraiato sul lato destro
  - C) In posizione Trendelenburg



21. L'isolamento funzionale:
- A) Richiede la disponibilità di un bagno dedicato
  - B) Si applica quando non è disponibile una camera singola e il ricovero per coorti non è realizzabile o raccomandabile
  - C) Si applica solo a pazienti che presentano lo stesso agente infettivo
22. Nella valutazione delle LdP con la scala di Braden si prende in considerazione:
- A) Condizioni generali, umidità, stato mentale, nutrizione, incontinenza, attività fisica
  - B) Percezione sensoriale, umidità, attività fisica, mobilità, nutrizione, frizione e scivolamento
  - C) Condizioni generali, deambulazione, incontinenza, frizione e scivolamento, attività fisica, nutrizione
23. Per pollachiuria si intende:
- A) L'elevata frequenza delle minzioni
  - B) L'eccessiva quantità di urina prodotta
  - C) La perdita involontaria di urina
24. L'acronimo M.M.S.E. significa?
- A) Macro Mental State Examination
  - B) Mini Mental Security Examination
  - C) Mini Mental State Examination
25. Quale dei seguenti interventi NON è indicato se durante l'alimentazione attraverso il sondino si manifesta il vomito?
- A) Posizionare il paziente seduto
  - B) Aspirare immediatamente attraverso il sondino
  - C) Rimuovere immediatamente il sondino
26. I sintomi della ipoglicemia di un soggetto diabetico e insulino-dipendente sono:
- A) Sudorazione, astenia, tachicardia, tremore
  - B) Sudorazione, bradicardia, poliuria
  - C) Secchezza della cute, astenia, tachicardia
27. Quali sono gli effetti collaterali alla somministrazione di morfina?
- A) Depressione del SNC, diminuzione della peristalsi intestinale, nausea, vomito, sedazione, depressione respiratoria, riduzione del riflesso della tosse
  - B) Depressione del SNC, aumento della peristalsi intestinale, nausea, vomito, sedazione, depressione respiratoria, riduzione del riflesso della tosse
  - C) Depressione del SNC, diminuzione della peristalsi intestinale, nausea, vomito, sedazione, depressione respiratoria, aumento del riflesso della tosse
28. In caso di mantenimento delle normali funzioni fisiologiche, in assenza totale di assunzione per altre vie e di patologie controindicanti, il quantitativo di liquidi da infondere per vie endovenose raccomandato è:
- A) Circa 10/15 ml/kg/die
  - B) Circa 1500 ml/die
  - C) Circa 25/30 ml/kg/die
29. L'ernia iatale è una protrusione:
- A) Del peritoneo viscerale
  - B) Dello stomaco al di sopra del diaframma
  - C) Dell'intestino dalla parete addominale
30. In Excel, come vengono identificate le celle?
- A) Da una combinazione numero - asterisco
  - B) Da una combinazione numero - simbolo
  - C) Da una combinazione numero - lettera



BARRARE CON UNA "X" LA RISPOSTA CHE SI RITIENE CORRETTA

1. Quali sono gli effetti collaterali alla somministrazione di morfina?
  - A) Depressione del SNC, diminuzione della peristalsi intestinale, nausea, vomito, sedazione, depressione respiratoria, riduzione del riflesso della tosse
  - B) Depressione del SNC, aumento della peristalsi intestinale, nausea, vomito, sedazione, depressione respiratoria, riduzione del riflesso della tosse
  - C) Depressione del SNC, diminuzione della peristalsi intestinale, nausea, vomito, sedazione, depressione respiratoria, aumento del riflesso della tosse
2. L'isolamento funzionale:
  - A) Richiede la disponibilità di un bagno dedicato
  - B) Si applica quando non è disponibile una camera singola e il ricovero per coorti non è realizzabile o raccomandabile
  - C) Si applica solo a pazienti che presentano lo stesso agente infettivo
3. Prima della somministrazione di alimentazione tramite sondino naso gastrico:
  - A) Si deve verificare la presenza di ristagno gastrico
  - B) Si devono iniettare almeno 50 ml di acqua
  - C) Si modifica leggermente la posizione del sondino per essere certi che non aderisca alla parete gastrica
4. In quali casi l'intervento di contenzione deve essere documentato all'interno della cartella sanitaria?
  - A) Dipende dal tipo di contenzione
  - B) Sempre
  - C) In base a valutazione medica sul paziente
5. Quale posizione deve assumere il paziente per consentire la raccolta di succo gastrico dal sondino?
  - A) Sdraiato sul lato sinistro
  - B) Sdraiato sul lato destro
  - C) In posizione Trendelenburg
6. Nella valutazione delle LdP con la scala di Braden si prende in considerazione:
  - A) Condizioni generali, umidità, stato mentale, nutrizione, incontinenza, attività fisica
  - B) Percezione sensoriale, umidità, attività fisica, mobilità, nutrizione, frizione e scivolamento
  - C) Condizioni generali, deambulazione, incontinenza, frizione e scivolamento, attività fisica, nutrizione
7. Quale dei seguenti interventi NON è indicato se durante l'alimentazione attraverso il sondino si manifesta il vomito?
  - A) Posizionare il paziente seduto
  - B) Aspirare immediatamente attraverso il sondino
  - C) Rimuovere immediatamente il sondino
8. Con l'acronimo FASAS si intende:
  - A) Fascicolo Socio Assistenziale e Sanitario
  - B) Fascicolo Sociale Assistenziale Singolo
  - C) Fascicolo Socio Assistenziale e Sicurezza
9. Che cos'è il Piano Sanitario Nazionale?
  - A) Il documento programmatico mediante il quale sono stabilite le linee di indirizzo dell'ATS
  - B) Il documento programmatico mediante il quale sono stabilite le linee generali di indirizzo del Servizio Sanitario Nazionale
  - C) Il documento programmatico adottato dall'OMS di concerto con il Ministro della Salute per la tutela della salute di chi viaggia
10. Le ulcere da pressione allo stadio 3 e 4 sono più facilmente infettate da:
  - A) Aerobi gram negativi
  - B) Cocchi gram positivi
  - C) Anaerobi



11. Se durante una trasfusione di globuli rossi il paziente manifesta brividi, cefalea, dolori, sensazione di calore, è necessario immediatamente:
- A) Diminuire la velocità di infusione e chiamare il medico
  - B) Sospendere la trasfusione, tenere la vena aperta con soluzione fisiologica e chiamare il medico
  - C) Controllare i parametri vitali e chiamare il medico
12. Un paziente che assume warfarin per f.a. cronica, il giorno antecedente l'intervento chirurgico, è probabile che:
- A) Riceva solo eparina a basso peso molecolare s.c.
  - B) Assuma warfarin come sempre
  - C) Assuma warfarin a metà dosaggio associato ad eparina s.c.
13. Prima di procedere con la broncoaspirazione il paziente va ossigenato:
- A) Per pochi secondi
  - B) Per almeno tre minuti
  - C) Per almeno un minuto
14. In caso di delirium nell'anziano, quali farmaci possono avere un effetto paradossale peggiorando l'agitazione?
- A) Le benzodiazepine
  - B) L'aloiperidolo
  - C) Gli antipsicotici atipici
15. Quali fra queste è una causa predisponente alla infezione da Clostridium Difficile nell'anziano?
- A) Terapia antibiotica ad ampio spettro prolungata
  - B) Disidratazione
  - C) Diabete Mellito tipo 2
16. Che cosa s'intende per wandering?
- A) Deambulazione afinalistica
  - B) Deambulazione associata a bradicinesia
  - C) Deambulazione instabile
17. In caso di sovradosaggio da Aloperidolo, quali sintomi possono manifestarsi?
- A) Nausea e/o vomito
  - B) Rigidità extrapiramidale
  - C) Diplopia
18. L'alimentazione dell'anziano con sarcopenia deve prevedere principalmente:
- A) Aumento della percentuale calorica
  - B) Aumento della percentuale di proteine
  - C) Aumento della percentuale di fibre
19. Nell'occlusione intestinale l'alvo è:
- A) chiuso a gas e feci
  - B) aperto a gas e feci
  - C) aperto ai gas
20. Per valutare lo spettro più ampio possibile di anomalie comportamentali nella persona affetta da demenza, quale tra le seguenti scale posso impiegare?
- A) BDI
  - B) CDR
  - C) UCLA NPI





CASA ANZIANI INTERCOMUNALE  
UGGIATE TREVANO

SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER LA FORMAZIONE DI UNA  
GRADUATORIA AI FINI DELL'ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DI  
INFERMIERI  
20 LUGLIO 2021

**PROVA SCRITTA N° 3**

21. In caso di mantenimento delle normali funzioni fisiologiche, in assenza totale di assunzione per altre vie e di patologie controindicanti, il quantitativo di liquidi da infondere per vie endovenosa raccomandato è:
- A) Circa 10/15 ml/kg/die
  - B) Circa 1500 ml/die
  - C) Circa 25/30 ml/kg/die
22. I requisiti sostanziali e formali della documentazione sanitaria devono essere:
- A) Veridicità, chiarezza, completezza, contestualità e rintracciabilità, indicazione di data e ora, precisazione nome e cognome, firma, intellegibilità della grafia
  - B) Veridicità, completezza, contestualità e rintracciabilità, indicazione di data e ora, precisazione nome e cognome, firma
  - C) Veridicità, chiarezza, completezza, contestualità e rintracciabilità, indicazione di data e ora, precisazione nome e cognome, firma, intellegibilità della grafia, annotazioni postume
23. Per pollachiuria si intende:
- A) L'elevata frequenza delle minzioni
  - B) L'eccessiva quantità di urina prodotta
  - C) La perdita involontaria di urina
24. La fragilità include dimensioni di tipo:
- A) Fisico biologico
  - B) Fisico biologico sociale
  - C) Fisico biologico psicologico sociale
25. Quando cominciare l'alimentazione dopo il confezionamento di una PEG primo impianto?
- A) Dopo 24 ore, velocità 40 cc/h
  - B) Dopo 12 ore, velocità 40 cc/h
  - C) Dopo 8 ore, velocità 40 cc/h
26. I quattro principi della Bioetica sono:
- A) Beneficienza, non maleficenza, equità, autonomia
  - B) Giustizia, intangibilità, fermezza, sicurezza
  - C) Equità, autonomia, efficienza, beneficienza
27. L'atassia è:
- A) La differenza del diametro delle due pupille
  - B) La perdita della capacità di parlare
  - C) Incoordinazione nell'esecuzione dei movimenti
28. La riacutizzazione della BPCO è caratterizzata:
- A) Da ipossiemia tale da mettere a rischio la vita del paziente
  - B) Dalla comparsa di dispnea, oppressione toracica, anemia e febbre
  - C) Dalla comparsa e peggioramento della dispnea con tosse ed aumento dell'escreato
29. È indice di malnutrizione severa:
- A) Una perdita di peso superiore al 20% in sei mesi
  - B) Una perdita di peso del 10% in un anno
  - C) Una perdita di peso del 10% in sei mesi
30. Le credenziali di accesso al PC di norma sono composte da:
- A) nome utente e cognome utente
  - B) nome utente e password
  - D) chiave di accesso e password